### ИНСТРУКЦИЯ

### по правилам оказания первой помощи

### для обучающихся, воспитанников МБОУ ДО «Кировская ДЮСШ»

### ИОТ 13-2016/Д

### Общие требования

Первая помощь при различных травмах оказывается с использованием перевязочных материалов и лекарственных препаратов, которые находятся в аптечке первой помощи. Аптечки первой помощи находятся:

- Гимнастическом зале;
- Зале хореографии;
- Зале общей физической и силовой подготовки;
- В кабинете зам. директора по УВР

Настоящая инструкция представляет собой краткое руководство к действию по оказанию первой помощи при несчастных случаях в различных обстоятельствах.

#### ВНИМАНИЕ!

Данная схема является универсальной для всех случаев оказания первой помощи на месте происшествия.

Какое бы несчастье ни произошло — автодорожное происшествие, падение с высоты, поражение электрическим током или утопление — в любом случае оказание помощи следует начать с восстановления сердечной деятельности и дыхания, затем решать вопрос о временной остановке кровотечения.

Только после решения этих задач можно приступить к наложению повязок и транспортных шин.

Транспортных шин.

Именно такая схема действий поможет сохранить жизнь пострадавшего до

| Приступить к реанимации | При артериальном кровотечении | При артериальном кровотечении | Наложить жгут | При наличии ран | Наложить повязки | При есть признаки переломов костей конечностей | Наложить транспортные шины | При есть признаки переломов костей конечностей | Наложить транспортные шины | При есть признаки переломов костей конечностей | Наложить транспортные шины | При есть признаки переломов костей конечностей | При есть признаки переломов костей | При есть п

### ПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ОСНОВНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ

### КОГДА СЛЕДУЕТ НАКЛАДЫВАТЬ ДАВЯЩИЕ ПОВЯЗКИ

- 1. При кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны.
- 2. Сразу после освобождения конечностей при синдроме сдавливания

### КОГДА СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО НАЛОЖИТЬ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЖГУТ

- 1. Алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей
- 2. Над раной образуется валик из вытекающей крови
- 3. Большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего

### КОГДА НЕОБХОДИМО НАКЛАДЫВАТЬ ЗАЩИТНЫЕ ЖГУТЫ

В случаях синдрома сдавления до освобождения конечностей

### КОГДА НЕОБХОДИМО НАКЛАДЫВАТЬ ШИНЫ НА КОНЕЧНОСТИ

- 1. Видны костные отломки
- 2. При жалобах на боль
- 3. При деформации и отеках конечностей
- 4. После освобождения придавленных конечностей
- 5. При укусах ядовитых змей

### КОГДА НЕОБХОДИМО ПЕРЕНОСИТЬ ПОСТРАДАВШИХ НА ЩИТЕ С ПОДЛОЖЕННЫМ ПОД КОЛЕНИ ВАЛИКОМ ИЛИ НА ВАКУУМ-НОСИЛКАХ В ПОЗЕ «ЛЯГУШКИ»

- 1. При подозрении на прелом костей таза
- 2. При подозрении на прелом верхней трети бедренной кости и повреждение тазобедренного сустава
- 3. При подозрении на повреждение позвоночника и спинного мозга

### КОГДА ПОСТРАДАВШИХ ПЕРЕНОСЯТ ТОЛЬКО НА ЖИВОТЕ

- 1. В состоянии комы
- 2. При частой рвоте
- 3. В случаях ожогов спины
- 4. При подозрении на повреждение спинного мозга, когда в наличии есть брезентовые носилки

## КОГДА ПОСТРАДАВШИХ МОЖНО ПЕРЕНОСИТЬ И ПЕРЕВОЗИТЬ ТОЛЬКО СИДЯ ИЛИ ПОЛУСИДЯ

- 1. При проникающих ранениях грудной клетки
- 2. При ранениях шеи

## КОГДА ПОСТРАДАВШЕГО МОЖНО ПЕРЕНОСИТЬ ТОЛЬКО НА СПИНЕ С ПРИПОДНЯТЫМИ ИЛИ СОГНУТЫМИ В КОЛЕНЯХ НОГАМИ

- 1. При проникающих ранениях брюшной полости
- 2. При большой кровопотере или при подозрении на внутреннее кровотечение

## ПРИЗНАКИ ОПАСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ И СОСТОЯНИЙ

# ПРИЗНАКИ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ (КОГДА КАЖДАЯ ПОТЕРЯННАЯ СЕКУНДА МОЖЕТ СТАТЬ РОКОВОЙ)

- 1. Отсутствие сознания
- 2. Нет реакции зрачков на свет
- 3. Нет пульса на сонной артерии

### ПРИЗНАКИ КОМЫ

- 1. Потеря сознания более чем на 4 минуты
- 2. Обязательно есть пульс на сонной артерии

## ПРИЗНАКИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ (КОГДА ПРОВЕДЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ БЕССМЫСЛЕННО)

- 1. Высыхание роговицы глаза (появление «селедочного» блеска)
- 2. Деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами.

3. Появление трупных пятен

### ПРИЗНАКИ АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

- 1. Алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей
- 2. Над раной образуется валик из вытекающей крови
- 3. Большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего

### ПРИЗНАКИ ВЕНОЗНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

- 1. Кровь пассивно стекает из раны
- 2. Очень темный цвет крови

### ПРИЗНАКИ ИСТИННОГО УТОПЛЕНИЯ

- 1. Кожа лица и шеи с синюшным отеком
- 2. Набухание сосудов шеи
- 3. Обильные пенистые выделения изо рта и носа

### ПРИЗНАКИ ОБМОРОКА

- 1. Кратковременная потеря сознания (не более 3-4 минут)
- 2. Потере сознания предшествуют: резкая слабость, головокружение, звон в ушах и потемнение в глазах

### ПРИЗНАКИ БЛЕДНО УТОПЛЕНИЯ

- 1. Бледно-серый цвет кожи
- 2. Широкий нереагирующий на свет зрачок
- 3. Отсутствие пульса на сонной артерии
- 4. Часто сухая, легко удаляемая платком пена в углах рта

### ПРИЗНАКИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ

- 1. Озноб и дрожь
- 2. Нарушение сознания:
- заторможенность и апатия
- бред и галлюцинации
- неадекватное поведение
- 3. Посинение или побледнение губ
- 4. Снижение температуры тела

### ПРИЗНАКИ ОТКРЫТОГО ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ

- 1. Видны костные отломки
- 2. Деформация и отек конечности
- 3. Наличие раны, часто с кровотечением

### ПРИЗНАКИ СИНДРОМА СДАВЛЕНИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ (ПОЯВЛЯЮТСЯ СПУСТЯ 15 МИНУТ)

- 1. После освобождения сдавленной конечности резкое ухудшение состояния пострадавшего
- 2. Появление отека конечности с исчезновением рельефа мышц
- 3. Отсутствие пульса у лодыжек
- 4. Появление розовой или красной мочи

### ПРИЗНАКИ ОБМОРОЖЕНИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

- 1. Потеря чувствительности
- 2. Кожа бледная, твердая и холодная на ощупь
- 3. Нет пульса у лодыжек
- 4. При постукивании пальцем «деревянный» звук ПРИЗНАКИ ЗАКРЫТОГО ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТИ

- 1. сть
- 2.
- 3.